

Informations relatives à la sortie

Instructions relatives à la sortie des patients :

Prenez tous vos comprimés ou gouttes antibiotiques éventuellement prescrits par votre médecin, selon ses instructions. Vous pouvez ressentir une pression et une gêne après la mise en place du tampon RAPID RHINO. Si votre douleur augmente même après la prise des médicaments prescrits, consultez immédiatement votre médecin. Il est recommandé de ne pas tirer ni tenter d'ajuster le tampon RAPID RHINO après sa mise en place. Pour assurer un résultat optimal, évitez de vous moucher. Évitez de respirer de la fumée de tabac ou des vapeurs de produits de nettoyage, car cela risque d'irriter votre nez. Si possible, restez dans un environnement humide ou utilisez du sérum physiologique en spray nasal pour maintenir l'humidité du nez, permettre la cicatrisation et soulager la congestion nasale du côté qui ne saigne pas.

Pensez à demander à votre médecin :

- Quels médicaments et sprays nasaux dois-je prendre ?
- Mon saignement de nez est-il antérieur ou postérieur, et quelle est la différence ?
- Que dois-je faire si le saignement continue après mon retour à domicile ?

Si vous présentez un des problèmes ci-dessous, consultez immédiatement un médecin

- Votre nez continue à saigner après votre sortie du centre médical (toux avec expectoration de sang provenant de l'arrière de la gorge)
- Le tampon RAPID RHINO se déloge et se déplace dans le nez ou en sort
- Vous vous sentez faible ou avez des vertiges
- Vous avez des difficultés à respirer
- Vous éprouvez des difficultés à vous lever
- Votre niveau de douleur augmente
- Vous développez de la fièvre
- Vous commencez à vomir
- Vous êtes inquiet(e) à propos de votre état de santé ou vous avez des questions concernant votre traitement

Remarque : Si vous présentez un autre événement de saignement de nez, consultez immédiatement un médecin. Avant d'arriver au centre médical, penchez la tête en avant et appliquez une pression sur l'avant du nez à l'aide de deux doigts, tout en respirant par la bouche. Vous pouvez appliquer une pression de chaque côté de l'arête du nez de façon à fermer les deux narines. Si du sang s'écoule dans votre gorge jusqu'à votre estomac, cela peut favoriser des nausées et des vomissements.

Au service des professionnels de santé depuis plus de 150 ans

